



# RAPANE VEINÉ

*Rapana venosa*



© G. CHERNILEVSKY



© J. TRAUSEL

## Milieu de vie

- Dans les fonds meubles du littoral (pollués et à faible teneur en oxygène)
- Supporte de fortes variations de température et de salinité



© P. BAZILE

## Identification

- Escargot marin (Mollusque – gastéropode)
- Taille : jusqu'à 18 cm de long et 10 cm de large
- Morphologie :
  - Coquille ovale et globuleuse
  - Spires peu développées
  - Présence de petites dents sur la crête d'enroulement
  - Veines noires et blanches
  - Ouverture large et ovale avec un opercule corné
  - Nacre interne orangée

## Reproduction

- Accouplement à la fin de l'hiver
- Ponte de 50 à 1000 œufs dans une capsule
- Ecllosion entre 14 et 21 jours des larves planctoniques se métamorphosant après 80 jours en adulte benthique



# RAPANE VEINÉ

*Rapana venosa*



## Confusions possibles


### *Stramonita haemastoma*

Taille plus petite  
(9 cm)

Spires  
développées


Ouverture  
rouge-orangée

Opercule  
marron-rouge



© J. TRAUSEL

© J. TRAUSEL



Opercule marron

Ouverture orangée

Spires peu  
développées

Stries noires et  
blanches sur les  
spires  
d'enroulement

*Rapana venosa*

Peut également être confondu avec les autres *Rapana sp.* qui ne possèdent pas de veines noires et blanches sur les spires d'enroulement